



Les **Mustélidés (Mustelidae)**, du latin *mustela* signifiant **belette**, sont une **famille** de **mammifères caniformes** de l'**ordre** des **Carnivora**. Ce sont des **prédateurs**, de taille variée (de 20 cm à plus de 2 m), avec un corps allongé et des pattes courtes. Ils possèdent des glandes sécrétrices développées, de chaque côté de l'anus, qui peuvent dégager une odeur musquée en cas d'attaque. Divisée en plusieurs **sous-familles**, la famille des Mustélidés comprend 55 **espèces** réparties en une vingtaine de **genres**. Elle est proche de la famille des **mouffettes (Mephitidae)**.



Furet (*Mustela putorius furo*)



Arbre phylogénétique des Mustelidae. Contient 53 espèces de mustélidés. ¹²

Les **Viverridés (Viverridae)** sont une famille de **mammifères carnivores félifformes**, Elle comprend trente-cinq **espèces** différentes réparties en quinze **genres** distincts et subdivisés en huit **sous-familles**.

En font partie les **genettes, civettes, mangoustes** (dont les **suricates**) et **binturongs**. Ce sont des animaux de taille moyenne avec un corps allongé et des pattes assez courtes. Ils sont **arboricoles**, plutôt nocturnes et ne dédaignent pas de compléter leur régime carné par des fruits.

Le seul représentant en Europe est la **genette commune** que l'on rencontre autour du **bassin méditerranéen**. Les autres viverridés se rencontrent en **Afrique** et en **Asie**.

Les viverridés sont appréciés pour leur fourrure, certaines espèces ont des glandes péri anales qui produisent une substance appelée « civette » utilisée en parfumerie. Enfin la viande de civette est consommée en **Asie**. Les scientifiques soupçonnent cette pratique d'être à l'origine de l'apparition d'une nouvelle forme de **pneumonie virale** sévère en 2002 : le **SRAS**¹.

Certains viverridés **ronronnent**² comme **Genetta tigrina**^{3, n 1} et **Genetta genetta**⁴.



Un **Luwak**, une **Genette commune**, une **Civette masquée** et un **Binturong**

